A. BIPACKSEDEL

BIPACKSEDEL

1. Det veterinärmedicinska läkemedlets namn

Apiguard vet 12,5 g gel för honungsbin

2. Sammansättning

1 behållare med 50 g innehåller

Aktiva substanser:

Tymol 12,5 g

Lätt opalskimrande, färglös till rosa, kornig gel.

3. Djurslag

Honungsbin *(Apis mellifera)*.

4. Användningsområden

Behandling av *Varroa destructor* infestation.

5. Kontraindikationer

Inga.

6. Särskilda varningar

Särskilda varningar:

Försiktighet bör iakttas för att säkerställa rätt dosering, eftersom fel dosering kan få skadliga effekter på kolonin.

Detta läkemedel ska användas som en del av ett integrerat varroa kontrollprogram.

Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning hos det avsedda djurslaget:

Behandling skall inte genomföras under honungsdrag för att undvika påverkan på honungssmaken. Behandlingen kan genomföras omedelbart efter det att skattlådorna tagits bort.

Använd inte läkemedlet när den maximala dagstemperaturen under behandlingen förväntas underskrida 15 °C eller när aktiviteten i kolonin är mycket låg, eller när temperaturen överstiger 40 °C.

Sammanför svaga kolonier före behandling.
Alla kolonier i en bikupa bör behandlas samtidigt.

Normalt beteende hos bin innebär att ta bort eller rengöra gelen från behållaren ovanför yngelramarna utan effekt på kolonin, men, särskilt hos mer hygieniska stammar, kan vissa bin ibland även ta bort

bilarver som inte täcks av vaxlock från närheten av läkemedlet. Om detta observeras, ta bort läkemedlet från kolonin.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Skyddsutrustning i form av ogenomträngliga handskar ska användas vid hantering av läkemedlet.

Undvik direktkontakt med hud och ögon på grund av möjlig kontaktdermatit och hud- och ögonirritation.
Tvätta händer och material som varit i kontakt med gelen med tvål och vatten efter användning.
Vid hudkontakt, tvätta det drabbade området noggrant med tvål och vatten.
Vid ögonkontakt, skölj ögonen noggrant med rikligt med rinnande, rent vatten och uppsök läkare.
Andas inte in läkemedlet.

Personer med känd överkänslighet mot tymol bör undvika kontakt med läkemedlet.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Inga kända.

Överdosering:

En högre dos än den rekommenderade (50 g gel per applicering, motsvarande 12,5 g tymol) kan orsaka störningar i kolonins beteende (oro, rymning eller ökad dödlighet). Vid överdosering, avlägsna det överflödiga läkemedlet från kolonin.

7. Biverkningar

Honungsbin *(Apis mellifera)*:

Sällsynta (1 till 10 av 10 000 behandlade djur):	Oro[1] Yngeldöd[2], yngelborttagning[3]

[1]Lätt, under behandling.
[2]Vid hög temperatur kan en liten minskning av antalet biyngel uppkomma under behandlingsperioden; detta är emellertid övergående och påverkar inte kolonins utveckling.
[3]Lokaliserad.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning eller dennes lokala företrädare genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna bipacksedel, eller via ditt nationella rapporteringssystem:

Läkemedelsverket
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

8. Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg(ar)

Användning i bikupa

Behandling i bikupan: En behållare à 50 g gel per koloni. Efter 2 veckor sätt in ny behållare à 50 g gel. En behandling = 2 behållare. Maximalt två behandlingar per år.

Administreringssätt

Öppna bikupan. Dra av folielocket från behållaren tills det bara sitter fast i ett hörn. Placera den öppna behållaren i mitten ovanpå ramarna med gelsidan uppåt. Kontrollera att det blir minst 0,5 cm fritt utrymme mellan behållarens ovansida och bikupans lock. Stäng bikupan. Ta bort den första behållaren efter två veckor och sätt dit en ny på samma sätt. Lämna läkemedlet i kolonin tills behållaren är tom. Ta bort läkemedlet när skattlådorna installeras i kolonin.

Läkemedlets effekt maximeras om det används på sensommaren efter honungsskörden (när antalet biyngel minskar). Vid allvarliga angrepp kan läkemedlet emellertid även användas på våren när temperaturen är över 15 °C.

Effekten kan variera mellan olika kolonier på grund av appliceringssättet. Läkemedlet bör därför användas som en behandling bland flera andra i ett integrerat program för skadedjursbekämpning och regelbunden kontroll av nedfallet kvalster. Vid observation av ytterligare stora kvalsternedfall följande vinter eller vår rekommenderas en andra vinter- eller vårbehandling för varroa.

9. Råd om korrekt administrering

Behandlingen kan genomföras omedelbart efter det att skattlådorna tagits bort.
Sammanför svaga kolonier före behandling.
Alla kolonier i en bikupa bör behandlas samtidigt.

10. Karenstider

Honung: Noll dygn.
Använd inte under honungsdrag.

11. Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 30 °C.
Får ej frysas.
Förvaras i originalförpackningen.
Skyddas mot direkt solljus.
Förvara inte läkemedlet nära bekämpningsmedel eller andra kemiska ämnen som skulle kunna kontaminera läkemedlet.
Förvaras åtskilt från livsmedel.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12. Särskilda anvisningar för destruktion

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Läkemedlet får inte släppas ut i vattendrag på grund av att tymol kan vara farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Fråga veterinär eller apotekspersonal hur man gör med läkemedel som inte längre används.

13. Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptfritt läkemedel.

14. Nummer på godkännande för försäljning och förpackningsstorlekar

43556

Aluminiumbehållare stängd med ett aluminiumlock i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

Kartong med 10 behållare med 50 g gel.

15. Datum då bipacksedeln senast ändrades

2026-09-23

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Kontaktuppgifter

Innehavare av godkännande för försäljning och kontaktuppgifter för att rapportera misstänkta biverkningar:
Vita Bee Health Limited
1 Castlewood Avenue
Rathmines
Dublin 6
D06 H685
Irland
+44 1256 473 175
info@vita-europe.com

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Cicieffe s.r.l.
via. G. Marconi n. 13
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Italien