BIPACKSEDEL

1. Det veterinärmedicinska läkemedlets namn

Apistan vet 824 mg bikupestrip

2. Sammansättning

Varje bikupestrip innehåller:

Tau-fluvalinat 824 mg

Ljust guldgul till rosa färg.
Remsa som mäter 25 x 3 x 0,075 cm.

3. Djurslag

Bin.

4. Användningsområden

Apistan vet-remsor innehåller en polymer som ger kontrollerad frisättning av tau-fluvalinat för bekämpning av parasitkvalstret *Varroa destructor* (tidigare kallat *Varroa jacobsoni*) hos bin.

5. Kontraindikationer

Inga.

6. Särskilda varningar

Särskilda varningar:

Resistens mot tau-fluvalinat har iakttagits i vissa populationer av *Varroa*-kvalster. Det är därför rekommenderat att, om möjligt, utföra lämpliga tester (t.ex. Vita-/NBU-test eller Beltsvilletest) för att avgöra om det finns resistenta kvalster i kvalsterpopulationen innan bisamhället behandlas.

Kvalsternedfall bör kontrolleras före och efter användning av läkemedlet för att avgöra hur effektiv behandlingen är; detta gäller särskilt om det inte varit möjligt att utföra resistenstester innan bisamhället behandlas.

Användning av läkemedlet i bisamhällen där det finns kvalster som är resistenta mot något annat medel innehållande pyretroider (t.ex. flumetrin) rekommenderas inte, eftersom det är vanligt med korsresistens.

Läkemedlet bör användas som ett led i ett skadedjursbekämpningsprogram. Där så är möjligt rekommenderas att alternera användningen av detta läkemedel med en kvalsterbekämpningsprodukt som inte innehåller pyretroider.

Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning hos det avsedda djurslaget:

Tau-fluvalinat är ett fettlösligt ämne som kan ansamlas i vax vid upprepad användning. Därför bör

yngelramar regelbundet förses med nya vaxmellanväggar för att undvika ansamling av läkemedelsrester. Vax från behandlade bisamhällen ska inte heller återanvändas i yngel- eller honungsramar.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Detta läkemedel kan orsaka hud- och ögonirritation.
Skyddsutrustning i form av handskar ska användas vid hantering av läkemedlet.
Undvik direktkontakt med hud, mun och ögon.
Tvätta händerna grundligt med tvål och vatten efter hantering av remsor eller förorenade kläder.
Undvik att röka, dricka och äta vid hantering av remsorna.

Särskilda försiktighetsåtgärder för skydd av miljön:
Se avsnittet ”Särskilda anvisningar för destruktion”.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:
Inga kända.

Överdosering:
Specifik behandling saknas. I tveksamma fall ska läkemedlet avlägsnas från bisamhället.

7. Biverkningar

Bin.

Inga kända.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna bipacksedel, eller via ditt nationella rapporteringssystem:

Läkemedelsverket
www.lakemedelsverket.se

8. Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg(ar)

Användning i bikupa.

Doseringsanvisningar
Två Apistan vet-remsor per yngelrum per kupa.

Administrering:

Remsorna hängs mitt emellan två yngelramar så att bina kan röra sig på båda sidor av remsan. En remsa placeras mellan ram 3 och 4 och en mellan ram 7 och 8 i yngelrummet.

Till små och övervintrande bisamhällen och avläggare räcker det med en remsa som placeras nära mitten av yngelrummet. Remsorna får inte placeras i skattlådorna.

Behandlingsperiod
Behandlingen pågår under 6-8 veckor, och därefter tas remsorna bort och kasseras. Remsorna bör sitta kvar i kupan minst sex veckor. Remsorna får inte sitta kvar i kupan längre än åtta veckor. Behandlingsperioden bör hållas så kort som möjligt för att minska risken för läkemedelsrester i vaxet

från yngelrummet och förebygga resistensutveckling hos kvalstret. Kontakta veterinär eller den lokala bitillsynsmannen vid nya eller bestående angrepp.

Apistan vet har störst verkan om det används under sensommaren och efter den huvudsakliga honungsskörden (då antalet yngel avtar). Vid svåra angrepp kan Apistan vet dock användas när som helst under året.


9. Råd om korrekt administrering

BRUKSANVISNING

Användningssätt

Se avsnittet ”Särskilda varningar” före hantering av läkemedlet.

Remsorna sitter samman i ett ark. För att skilja dem åt, fatta det övre hörnet i ett fast grepp (se bild 1) och riv längs perforeringen uppifrån och ner. Oanvända remsor ska läggas tillbaka i originalförpackningen. Apistan vet-remsor placeras i yngelrummet (kupans huvuddel) på ett sådant sätt att bina kan röra sig på båda sidor av remsan. Remsorna hängs upp mellan ramarna genom att vingarna på remsan vrids utåt (se bild 2).



10. Karenstider

Honung: Noll dygn.
Använd inte läkemedlet under honungsdrag.
Ta inte honung från yngelkammaren.
Skörda inte honung medan behandling pågår.
För att undvika ansamling av läkemedelsrester i vaxet ska yngelramarna regelbundet förses med nya vaxmellanväggar.
Återanvänd inte vax från behandlade bisamhällen i yngel- eller honungsramar.

11. Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Remsorna ska förvaras i oöppnad originalförpackning innan användning.
Skyddas mot direkt solljus.
Inga särskilda temperaturanvisningar.
Remsorna får inte förvaras i närheten av bekämpningsmedel och andra kemikalier som kan förorena remsorna.
Förvaras åtskilt från livsmedel.
Oanvända remsor ska läggas tillbaka i originalförpackningen.
Endast för engångsbruk; remsorna får ej återanvändas.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12. Särskilda anvisningar för destruktion

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Detta läkemedel får inte släppas ut i vattendrag på grund av att tau-fluvalinat är EXTREMT FARLIGT för fiskar och andra vattenlevande organismer. Kontaminera inte dammar, vattendrag eller diken med remsor eller tomma förpackningar.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Fråga veterinär eller apotekspersonal hur man gör med läkemedel som inte längre används.

13. Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptfritt läkemedel.

14. Nummer på godkännande för försäljning och förpackningsstorlekar

44389

10 bikupestrips.

15. Datum då bipacksedeln senast ändrades

01/09/2026

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Kontaktuppgifter

Innehavare av godkännande för försäljning och kontaktuppgifter för att rapportera misstänkta biverkningar:

Vita Bee Health Limited
1 Castlewood Avenue
Rathmines
Dublin
D06 H685
Irland
+44 1256 473 175
info@vita-europe.com.

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

CICIEFFE S.R.L.
Via G. Marconi n. 13
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Italien

17. Övrig information