BIPACKSEDEL

1. Det veterinärmedicinska läkemedlets namn

Selevitan vet. 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, får och svin

2. Sammansättning

En ml innehåller:

Aktiva substanser:
all-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E) 50 mg
natriumselenit, motsvarande selen (Se^{4+}) 0,6 mg

Gul, klar till opaliserande lösning.

3. Djurslag

Nöt, får och svin.



4. Användningsområden

För förebyggande och behandling av selen- och/eller E-vitaminbrist. Exempel på sådana tillstånd är utfodringsbetingade sjukdomar i muskulatur hos svin, kalv och lamm (muskeldegeneration) samt i lever hos svin (toxisk leverdystrofi).

5. Kontraindikationer

Inga.

6. Särskilda varningar

Särskilda varningar:
Bör doseras enligt anvisningar för att undvika eventuell selentoxicitet.

Dräktighet och digivning:
Kan ges till dräktiga och digivande djur.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:
Inga kända.

Överdosering:
Selen är giftigt vid höga doser med risk för dödlig utkomst. Symtom så som ostadig gång, onormal kroppsställning, diarré, buksmärta, ökad puls och andning och skummande näsflöde kan ses vid doser över 1 mg/kg av selen. Kontakta veterinär vid misstanke om överdosering. Vid överdosering ges symtomlindrande behandling.

7. Biverkningar

Inga kända.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna bipacksedel, eller via ditt nationella rapporteringssystem: Läkemedelsverket Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

8. Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg(ar)

Läkemedlet ska injiceras intramuskulärt (i.m.). För att säkerställa att rätt dos ges bör kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt.

Djurslag	Dosering
Nöt	10 ml/100 kg kroppsvikt
Får och svin	1 ml/10 kg kroppsvikt

Vid konstaterande av sjukdomsfall bör hela djurgruppen behandlas. Rekommenderade doser är engångsdoser. Vid behov kan doseringen upprepas efter en vecka. Misstänker man fortsatt selen- och/eller E-vitaminbrist kan denna behandlas genom att tillföra djuren Selevitan vet. granulat i rekommenderad dosering.

9. Råd om korrekt administrering

-

10. Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 2 dygn.
Mjölk: noll dygn.

11. Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 4 veckor.

12. Särskilda anvisningar för destruktion

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

13. Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptbelagt läkemedel.

14. Nummer på godkännande för försäljning och förpackningsstorlekar

MTnr: 9498

Förpackningsstorlekar:
Pappkartong innehållande 100 ml och 6 x 100 ml glasflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

15. Datum då bipacksedeln senast ändrades

08/09/2026

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Kontaktuppgifter

Innehavare av godkännande för försäljning och kontaktuppgifter för att rapportera misstänkta biverkningar:
Pharmaxim AB
Örjaleden 48
26151 Landskrona
Sverige
Tel: +46 (0)42-38 54 50
drugsafety@pharmaxim.com

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Bela-Pharm GmbH & Co KG
Lohner Strasse 19
49377 Vechta
Tyskland