



## PRODUKTRESUMÉ

for

### Rabisin Vet., injektionsvæske, suspension

**0. D.sp.nr.**  
3824

**1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN**  
Rabisin Vet.

**2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING**  
1 dosis (1 ml) indeholder:

**Aktivt stof:**

Inaktiveret rabiesvirus, G52 stamme  $\geq 2,09 \log_{10} OD_{50}^*$  og  $\geq 1 IU^{**}$

**Adjuvans:**

Aluminiumhydroxid 1,7 mg.

\* når batchkontrol foretages med *in vitro* ELISA-test

\*\* når batchkontrol foretages ihht. Ph.Eur monografi 451

**3. LÆGEMIDDELFORM**  
Injektionsvæske, suspension

**4. KLINISKE OPLYSNINGER**

**4.1 Dyrearter**  
Hund. Kat. Hest. Kvæg. Får

**4.2 Terapeutiske indikationer**  
Vaccination mod rabies af hund, kat, hest, kvæg og får

**4.3 Kontraindikationer**  
Kun raske dyr bør vaccineres.

**4.4 Særlige advarsler**  
Ingen.

#### 4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

##### Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

##### Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen

#### 4.6 Bivirkninger

Forbigående systemisk reaktion (temperaturstigning, nedstemthed m.v.) kan ses i tilslutning til vaccination. Hævelse på injektionsstedet kan forekomme.

Som for alle vacciner kan en overfølsomhedsreaktion opstå efter vaccination. Disse er sjældne og korrekt symptomatisk behandling bør iværksættes.

#### 4.7 Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

#### 4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

#### 4.9 Dosering og indgivelsesmåde

Dosis er 1 ml til alle dyr uanset dyreart, alder og størrelse.

Injiceres intramuskulært eller subkutant, dog aldrig subkutant til heste.

#### Vaccinationsprogram:

Dyreart	Basisvaccination	Revaccination
Hund Kat	1 injektion fra 12-ugers alderen*	1 år efter basisvaccination, derefter hvert 3. år.**
Hest Kvæg Får	En injektion fra 4-måneders alderen ***	Årligt

\* Såfremt en hund eller kat er blevet vaccineret før 12 ugers alderen gives yderligere 1 injektion fra 12-ugers alderen.

*\*\* Revaccinations perioden skal være i overensstemmelse med national lovgivning. \*\*\*  
Såfremt hest, kvæg eller får vaccineres før 4 måneders alderen, skal yderligere en  
injektion gives, fra en alder af mindst 4 måneder.*

**4.10 Overdosering**

Ingen.

**4.11 Tilbageholdelsestid**

Hest, kvæg og får: 0 dage

## **5. IMMUNOLOGISKE EGENSKABER**

Farmakoterapeutisk gruppe Inaktiverede virale vacciner, rabiesvirus vaccine

ATCvet-kode: QI 07 AA 02

### **5.1 Immunologiske egenskaber**

Rabisin Vet., er en inaktiveret vaccinebaseret på rabiesvirus, G52-stammen, til aktiv immunisering af hund, kat, hest, kvæg og får mod rabies. Ved vaccination af drægtige dyr opnås passiv immunitet hos afkommet ved overførsel af antistoffer via kolostrum.

## **6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER**

### **6.1 Hjælpestoffer**

Aluminiumhydroxid

### **6.2 Uforligeligheder**

Ingen.

### **6.3 Opbevaringstid**

I salgspakning: 3 år

### **6.4 Særlige opbevaringsforhold**

Opbevares i køleskab ved (2°C - 8°C).

### **6.5 Emballage**

Hætteglas/dosissprøjter

### **6.6 Særlige forsigtighedsregler vedrørende bortskaffelse af rester eller evt. affald**

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

## **7. INDEHAVER AF**

**MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN** Boehringer  
Ingelheim Animal Health Nordics A/S Weidekampsgade 14  
2300 København S

## **8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)**

9961

## **9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE**

24. april 1980.

## **10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN**

3. maj 2023

## **11. UDLEVERINGSBESTEMMELSE**

BPK